

Galerina marginata



(Batsh) Kuhn.

Cappello: piccolo (in genere non oltre i 4 cm. di diametro), bruno, impallidente a secco (igrofano), con orlo striato

Lamelle: fitte, più o meno concolori

Gambo: più o meno concolore, con anello fugace e fibrille biancastre sotto l'anello

Odore e sapore: leggermente farinosi

Crescita: in file di pochi esemplari o in piccoli gruppi

Principalmente confondibile con

"Kuehneromyces mutabilis" ("Pholiota mutabilis"), ottimo commestibile parimenti lignicolo, la cui distinzione, spesso, non è alla portata del principiante. In effetti la differenza si basa su caratteri difficili da individuare quali le maggiori dimensioni degli esemplari, la crescita maggiormente a cespi, la presenza di piccole scaglie brune sotto l'anello e forse la maggiore igrofaneità (tendenza a cambiare colore a seconda dell'umidità).

Dove si trova

Fungo estivo-autunnale, presente sia nei boschi di conifere sia di latifoglie, su tronchi e rami morti. È comune, ma quasi sempre in pochi esemplari.

Commestibilità

VELENOSO MORTALE!

Potenzialmente pericoloso come l'"Amanita phalloides". Fortunatamente le piccole dimensioni, unicamente alla difficoltà di reperirlo in quantità pericolose, fanno sì che i casi di reale avvelenamento siano complessivamente pochi.

Osservazioni

Il genere "Galerina" comprende numerose specie tipicamente associate a muschi, salvo poche eccezioni tra cui, appunto la "Galerina marginata", legate ad un habitat lignicolo.

Ecologia

Fungo saprofita (legno in disfacimento).